

Stabilizator łokcia Epicomed MEDI



Cena: 189,99 zł

Opis słownikowy

Producent MEDI

Opis produktu

Stabilizator łokcia Epicomed MEDI to połączenie dzianiny uciskowej i dwóch wkładek silikonowych. Dzięki temu stabilizator wywołuje efekt masażu, który poprawia ukrwienie, prowadząc tym samym do szybszej resorpcji obrzęków i krwiaków. Epicomed stabilizator łokcia MEDI łagodzi także podrażnienia i ból. W zależności od obciążenia w trakcie pracy lub podczas uprawiania sportu pasek napinający można dostosować do indywidualnych potrzeb. W ten sposób można uniknąć nadmiernego obciążenia mięskulatury i ścięgien.

Co wyróżnia stabilizator łokcia Epicomed MEDI?

- anatomicznie uformowana opaska z podkładką silikonową z wypustkami
- zdejmowany pasek napinający do indywidualnego dopasowania nacisku
- bardzo elastyczna, oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina Clima-Comfort
- specjalnie tkana, miękka część Comfort-Zone w obszarze zgięcia zapobiega ściąganiu materiału i uciskowi.

Zastosowanie

- Zapalenie nadkłykcia boczego i przyśrodkowego
- Zwłóknienie łokcia
- Nadmiar mazi stawowej i opuchlizna w wyniku zapalenia stawów i artrozy
- Łokieć tenisisty i łokieć golfisty
- Chroniczne, pooperacyjne i potraumatyczne stany podrażnienia

Tabela rozmiarów

Skład materiału: poliamid, poliester, elastan, merino

Instrukcja prania

Przeciwwskazania

Nie stwierdzono dotychczas żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Jednak zbyt mocne ściśnięcie środków pomocniczych, np. ortez, może w niektórych przypadkach prowadzić do wystąpienia ucisku lub zwężenia naczyń lub nerwów. W przypadku wystąpienia poniższych schorzeń należy przed zastosowaniem opaski skonsultować się z lekarzem prowadzącym leczenie: Schorzenia lub uszkodzenia skóry na obszarze zastosowania produktu, przede wszystkim przy objawach zapalnych (nadmierne rozgrzanie, opuchlizna czy zaczerwienienie).

Zaburzenia czucia i dopływu krwi w nogach i stopach, np. w przypadku cukrzycy.

Zaburzenia odpływu limfy – również niejednoznaczne obrzmienie tkanek miękkich przy okolicy zastosowania opaski.

Stosowanie łącznie z innymi produktami, np. z pończochami uciskowymi należy wcześniej skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie.

Parametry

ROZMIAR

I, II, III, IV, V, VI

Galeria

